DLP 27-5-08019952



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Pomme de Terre

Bulletin Technique n°6 du 22 mai 2008 - 2 pages

Mildiou

Si les implantations très précoces sont assez bien développées, les plantations de fin avril - début mai sont hétérogènes, avec des plantes de 8-10 cm et d'autres non levées.

Comme attendu, les passages orageux de la fin de semaine passée, indépendament des quantités de pluies, ont été contaminateurs, et la 3ème génération de mildiou est désormais atteinte sur la grande majorité des postes de la région, voire la 4ème pour certains (voir tableau).

Situation au niveau du modèle GUNTZ DIVOUX

Stations météo SRPV – FREDON – données au 19 mai				
Postes	Génération en cours	Date des dernières contaminations	Date prévisionnelle sortie de taches	Pluies du 10 au 18 mai
77-Chevry Cossigny	3ème	15-17-18 mai	23 mai	20 mm
77-Villeroy	3ème	15 au 18 mai	23 mai	3 mm
78-Poissy	3ème	15-17-18 mai	23 mai	2 mm
78-Boissy Sans Avoir	3ème	15-17-18 mai	23 mai	16 mm
91-Abbeville la Rivière	4ème	15 au 18 mai	23 mai	
95-Villiers le Sec	4ème	15 au 18 mai	23 mai	48 mm
Stations météo France – données au 19 mai				
Postes	Génération en cours	Date des dernières contaminations	Date prévisionnelle sortie de taches	Pluies du 10 au 18 mai
78-Magnanville	2ème	15 mai	23 mai	40 mm
91-Bretigny sur Orge	3ème	15 mai	23 mai	47 mm
91-Courdimanche / Essonne	2ème	15 mai	23 mai	21 mm
91-Villiers le bacle	3ème	15 et 18 mai	23 mai	15 mm
95-Cormeilles en Vexin	3ème	15 au 18 mai	23 mai	34 mm
95-Roissy	3ème	15-17-18 mai	23 mai	42 mm
95-Wy dit joli village	3ème	15-17-18 mai	23 mai	36 mm

Pour tous les secteurs ayant atteint la 3ème génération, les variétés sensibles doit être sous protection mildiou. Pour ceux en 4ème génération, il convient de démarer la protection des variétés dites 'intermédiaires».
La présence de mildiou dans l'environnement des parcelles (tas de déchets, repousses, jardins de particuliers) entraîne une anticipation de la protection fongicide quelque soit la variété. Pour mémoire, les spores peuvent être véhiculées par le vent jusqu'à 1 km de distance.

Sensibilté de quelques variétés au mildiou (source SRPV-Fredon Picardie)

* sensibles : Agata, Amandine, Bintje, Calgary, Charlotte, Kapath vandel, Russet Burbank.

* intermédiaires : Centaure, Elkana, Monalisa, Oleva, Producent, Samba, Santana, Saturna, Turbo.

* résistantes : Bondeville, Hinga, Innovator, Kardal, Magnum, Naturella, Taranis.



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis
Directeur gérant : N. THERRE

Pucerons

Les infestations ont démarré, avec l'arrivée de pucerons ailés et les premiers aptères. Les fréquences de folioles porteurs de pucerons dans notre réseau vont de 0 à 20%.
Une intervention est prématurée.